

Tabela 1. Distribuição segundo os dados clínicos dos pacientes submetidos a angioplastia coronariana em uma unidade de referência, Manaus - AM.

Variáveis (n = 124)	f_i	%
História de tabagismo	57	46,0
DAC prévia	48	38,7
DAC familiar	15	12,1
Hipertensão	99	79,8
Diabetes	53	42,8
Dislipidemia	64	50,8
ATC AD HOC	45	36,3
RIS	18	14,5
Oclusão	20	16,1
Bifurcação	7	5,6
Enxerto	1	0,8
Pré-dilatação	79	63,7
Pós-dilatação	89	71,8
Disfunção ventricular	39	31,4
Número de artérias tratadas		
1	83	66,9
2 a 3	41	33,1
Número de stents		
1	56	45,2
2	54	43,5
3 a 4	14	11,3
Classificação da lesão		
A	10	8,1
B1	8	6,4
B2	13	10,5
C	93	75,0
Tempo de procedimento (em minutos)		
Q ₁ - Mediana – Q ₃	28,5 - 40,0 - 58,5	
Amplitude	10 - 120	
Volume do contraste (mL)		
Q ₁ - Mediana - Q ₃	150 – 200 – 250	
Amplitude	50 - 600	

f_i = frequência absoluta simples; Dp = desvio-padrão; Q_i = quartis.

Tabela 2. Distribuição segundo os dados clínicos dos pacientes submetidos a angioplastia coronariana em relação a troponina > 99 percentil, Manaus - AM.

Variáveis	Troponina > 99 percentil				Total	p
	Alterada (n = 79)		Normal (n = 45)			
	f _i	%	f _i	%		
Gênero						0,932*
Feminino	24	30,4	14	31,1	38	
Masculino	55	69,6	31	68,9	86	
Idade (anos)						0,839***
Média ± Dp	63,1 ± 10,2		62,7 ± 11,3			
Amplitude	43 – 86		23 – 78			
História de tabagismo	32	40,5	25	55,6	57	0,106*
DAC prévia	31	39,2	17	37,8	48	0,872*
DAC familiar	11	13,9	4	8,9	15	0,408*
Hipertensão	67	84,8	32	71,1	99	0,068*
Diabetes	34	43,0	19	42,2	53	0,930*
Dislipidemia	38	48,1	25	55,6	63	0,425*
ATC AD HOC	32	40,5	13	28,9	45	0,196*
RIS	10	12,7	8	17,8	18	0,436*
Oclusão	15	19,0	5	11,1	20	0,252*
Bifurcação	5	6,3	2	4,4	7	0,999**
Enxerto	-	-	1	2,2	1	0,363**
Pré-dilatação	50	63,3	29	64,4	79	0,898*
Pós-dilatação	59	74,7	30	66,7	89	0,340*
Disfunção ventricular	22	27,9	17	37,8	39	0,252*
Número de artérias tratadas						0,046***
Média ± Dp	1,40 ± 0,49		1,22 ± 0,47			
Amplitude	1 – 2		1 – 3			
Número de stents						<0,001***
Média ± Dp	1,82 ± 0,63		1,40 ± 0,72			
Amplitude	1 – 3		1 – 4			
Comprimento dos stents						0,147***
Q ₁ - Mediana - Q ₃	18 – 23 – 36		16 – 22 – 28			
Amplitude	8 – 70		8 – 99			
Tempo de procedimento						0,032****
Q ₁ - Mediana - Q ₃	32 – 45 – 60		25 – 37 – 48			
Amplitude	10 – 120		10 – 95			
Volume do contraste (mL)						0,008****
Q ₁ - Mediana - Q ₃	200-200-250		150-150-250			
Amplitude	100 - 450		50 - 600			

f_i = frequência absoluta simples; Dp = desvio-padrão; Q_i = quartis; * Teste do qui-quadrado de Pearson; ** Teste exato de Fisher; *** Teste t-student; **** Teste de Mann-Whitney.
Valor de p em negrito itálico indica diferença estatística ao nível de 5% de significância.

Tabela 3. Distribuição segundo os dados clínicos dos pacientes submetidos a angioplastia coronariana em relação a troponina, Manaus - AM.

Variáveis	Troponina 5x VN				Total	p
	Alterada (n = 31)		Normal (n = 93)			
	f _i	%	f _i	%		
Gênero						0,822*
Feminino	10	32,3	28	30,1	38	
Masculino	21	67,7	65	69,9	86	
Idade (anos)						0,723***
Média ± Dp	63,6 ± 9,2		62,8 ± 11,1			
Amplitude	46 - 84		23 - 86			
História de tabagismo	9	29,0	48	51,6	57	0,029*
DAC prévia	11	35,5	37	39,8	48	0,670*
DAC familiar	5	16,1	10	10,8	15	0,427*
Hipertensão	26	83,9	73	78,5	99	0,518*
Diabetes	14	45,2	39	41,9	53	0,753*
Dislipidemia	15	48,4	48	51,6	63	0,756*
ATC AD HOC	14	45,2	31	33,3	45	0,236*
RIS	3	9,7	15	16,1	18	0,558**
Oclusão	8	25,8	12	12,9	20	0,091*
Bifurcação	2	6,4	5	5,4	7	0,822*
Enxerto	-	-	1	1,1	1	0,999**
Pré-dilatação	20	64,5	59	63,4	79	0,914*
Pós-dilatação	25	80,6	64	68,8	89	0,205*
Disfunção ventricular	8	25,8	31	33,3	39	0,434*
Número de artérias tratadas						0,141***
Média ± Dp	1,45 ± 0,50		1,30 ± 0,48			
Amplitude	1 - 2		1 - 3			
Número de stents						<0,001***
Média ± Dp	2,03 ± 0,60		1,54 ± 0,68			
Amplitude	1 - 3		1 - 4			
Comprimento dos stents						0,027****
Q ₁ - Mediana - Q ₃	20 – 24 – 45		16 – 22 – 30			
Amplitude	10 – 70		8 – 99			
Tempo de procedimento						0,085****
Q ₁ - Mediana - Q ₃	35 – 45 – 63		25 – 40 – 55			
Amplitude	10 – 120		10 – 95			
Volume do contraste (mL)						0,011****
Q ₁ - Mediana - Q ₃	200-250-300		150-200-250			
Amplitude	100 - 450		50 - 600			

f_i = frequência absoluta simples; Dp = desvio-padrão; Q_i = quartis; * Teste do qui-quadrado de Pearson; ** Teste exato de Fisher; *** Teste t-student; **** Teste de Mann-Whitney. Valor de p em negrito itálico indica diferença estatística ao nível de 5% de significância.